「小児のこな薬の服用方法」パンフレットの使い方

表の使用方法

手順①　こな薬の名前を病院からもらった薬の説明書で確認して下さい

手順②　こな薬の種類によって使う表が違ってきます

- １種類 → 表１ オレンジ色部分のこな薬 → 表１ ［　　］ 欄の飲食物
- ２種類以上
  - → 表２ オレンジ色部分①～⑧ の場合 → 表２ ［　　］ 欄の飲食物　・・処方例 A
  - → 表２ オレンジ色部分①～⑧ と 青色部分のこな薬 の混合の場合 → 表２ オレンジ色部分 と 青色部分 の交差部分の飲食物・・処方例 B
  - → 上記の方法で見つからない場合 → 表１ ［　　］ 欄の共通飲食物・処方例 C

◈ 下記に処方例を書きましたので参考にして下さい ◈

処方例A

テルギンG
ムコサール
→ 表２ オレンジ色部分④ → お勧めは バニラアイス，プリン，牛乳
単シロップ，そのまま★，水

そのまま★ ：こな薬をそのまま口に入れた後に水で飲む方法

処方例 B

エリスリシン DSW・・表２ 青色部分
テルギンG
ムコサール
ビオフェルミンR
・表２ オレンジ色部分⑧
→ お勧めは交差部分の バニラアイス，プリン，牛乳
単シロップ

処方例 C

メイアクトＭＳ・・表１（抗菌薬）
ビオフェルミンＲ・表１（下痢･整腸）
→ お勧めは共通している バニラアイス，プリン，牛乳

クラリス，ジスロマック，タミフルのメーカーが配っている資料を表記しましたので参考にして下さい

	苦味を感じにくいお勧めの飲食物	苦い･まずい味になる飲食物
クラリス	牛乳，ｺﾝﾃﾞﾝｽﾐﾙｸ，ｺｺｱﾊﾟｳﾀﾞｰ，ｱｲｽｸﾘｰﾑ 砂糖，ﾌﾟﾘﾝ，ｸﾘｰﾐｰﾊﾟｳﾀﾞｰﾐﾙｸ(ｺｰﾋｰ用) 水羊羹，ﾋﾟｰﾅｯﾂｸﾘｰﾑ	ﾖｰｸﾞﾙﾄ，ﾌﾙｰﾂｼﾞｭｰｽ，ｽﾎﾟｰﾂﾄﾞﾘﾝｸ
ジスロマック	水，ｳｰﾛﾝ茶，ﾌﾟﾘﾝ，牛乳，ｺｰﾋｰ牛乳，ｱｲｽｸﾘｰﾑ	ｵﾚﾝｼﾞｼﾞｭｰｽ，ｱｯﾌﾟﾙｼﾞｭｰｽ等 ｽﾎﾟｰﾂﾄﾞﾘﾝｸ，ﾖｰｸﾞﾙﾄ
タミフル	ﾁｮｺｱｲｽ，ﾖｰｸﾞﾙﾄ，ｲﾁｺﾞ味ﾖｰｸﾞﾙﾄ，ｺｺｱ ｵﾚﾝｼﾞｼﾞｭｰｽ，ｽﾎﾟｰﾂﾄﾞﾘﾝｸ	乳酸菌飲料，ﾊﾞﾆﾗｱｲｽ，ｱｯﾌﾟﾙｼﾞｭｰｽ